# PRESTO

Fléole

## Fauche et Pâture

- Excellente production 1ère coupe
- Très faible remontaison
- Bonne résistance aux diverses maladies

## Identification

### Morphotype et précocité

| | | |
|---|---|---|
| Précocité | ½ Tardive | |
| Date départ en végétation | 07/04 * | |
| Date de début épiaison | 01/06 * | |
| Souplesse | 55.9 jours * | |
| Comportement Estival | -- | |
| Remontaison | 2.1 * | |
| Alternativité | 4.9 * | |
| Pérennité | 7.9 * | |

* Source: HerbeBook 2024

## Productivité

| | |
|---|---|
| Production 1ère coupe | 6.2 * |
| Production de printemps | 9.5 * |
| Production été / automne | 3.1 * |
| **Production annuelle totale** | **12.6 *** |

* Source: HerbeBook 2024

## Résistance aux maladies

| | |
|---|---|
| Maladies diverses | 5.5 * |

* Source: HerbeBook 2024

# Conseils de culture

## Aire de culture

Zones fraiches ou humide

## Préconisations de semis (Kg / ha)

| | |
|---|---|
| En pur | 25 - 30 |
| En association | 10% Trèfle Blanc |

Les informations sur les variétés, les recommandations et les représentations mentionnés sur ce site Web sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances et croyances, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exactitude. Nous ne pouvons garantir que les propriétés décrites sont reproductibles. Toutes les informations sont fournies pour aider à la prise de décision. Les compositions des mélanges peuvent changer si les variétés individuelles ne sont pas disponibles. Statut 01/2024, modifications réservées.