DART

- Hybride restauré MSL (co-obtention DSV/NPZ)
- Inscrit UK Janvier 2021
- Tolérant TuYV
- TPS cylindrosporiose
- TPS égrenage

Caractéristiques agronomiques

Cycle de développement

Vigueur départ 2 feuilles	Moyenne à forte
Vigueur départ 5 feuilles	Forte
Biomasse	Forte
Elongation automnale	Moyenne
Reprise C1	½ T
Vigueur D1	½ T à Intermédiaire
Vigueur D2	½ T à Intermédiaire
Pré floraison	Intermédiaire
Début floraison	Intermédiaire à ½ Précoce
Floraison	Intermédiaire à ½ Précoce
Fin floraison	Intermédiaire
Maturité	Intermédiaire

Caractères végétatifs

Hauteur	Moyenne
Froid	Peu sensible
Verse	Peu sensible
Egrenage	Très peu sensible

Comportement aux maladies

Phoma	TPS groupe II (Rlm7)
Pieds secs	Peu sensible
Cylindrosporiose feuille	Très peu sensible
Cylindrosporiose tige	Très peu sensible
Verticillium	Peu sensible

Composantes de rendement

Nb siliques	Assez élevé
Nb graines par silique	Assez élevé
Longueur de silique	Assez élevé
PMG	Faible à moyen
Tolérance égrenage	Elevée

Performances

Résultats rendement réseau Développement DSV 2019 et 2020

	Résultats rendement réseau Développement 2 lieux 2019 et 2 lieux 2020	
	Rdt 2019 (qx/ha)	Rdt 2020 (qx/ha)
Architect	45.7	44.7
DK Expansion	39.0	45.9
Temptation	47.1	45.8
KWS Cristiano	44.4	44.4
DART	**45.2**	**46.8**

Résultats huile réseau Développement DSV 2019 et 2020

	Résultats huile réseau Développement 1 lieu 2019 et 2020	
	Huile 2019 (%)	Huile 2020 (%)
Architect	44.7	50.7
DK Expansion	45.7	52.0
Temptation	46.7	51.8
KWS Cristiano	44.7	50.9
DART	**44.9**	**51.1**

Teneur huile de DART faible à moyenne

Teneur glucosinolates de DART moyenne

DSV France Sarl
34 rue de Charette
CS 28004
28140 Terminiers

Tél +33 (0) 2.37.90.21.23
service@dsv-france.fr

L'innovation au service de votre réussite

Les renseignements techniques contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent fluctuer selon les conditions climatiques, les conditions de culture et le contournement de la résistance aux maladies actuellement connues et étudiées en France.